

本草求真

本草求真卷六 第一冊

此書係明府王世貞先生所撰

卷六 瀉熱

瀉熱內經帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰
氣不宜通濕氣內結中外相薄寒盛熱生觀此則
知熱之由作悉皆外邪內入而熱是即本身元陽
為邪所遏一步一步而不得泄故爾變而為熱耳
然不乘勢以除則熱更有進而相爭之勢所以古
入有用三黃石膏及或大小承氣無非使其熱瀉
之謂余按熱病用瀉考之方書其藥甚衆然大
在肺則止用黃芩知母在胃則止用石膏大
黃在肺則止用黃芩在胃則止用石膏大
則止用以青黛龍膽在腎則止用山梔連翹木通在肝
則止用以石斛白芍此為諸臟瀉熱首劑至於

在肺又有他劑以瀉之熱邪初成未盛則或用
 以百合百部馬兜鈴青氣兼見則或用人參
 牛蒡子久嗽肺癰或用人參三焦熱併則或用人參
 用以慈苈仁咽癰疔漏則或用沙參脚氣兼見則
 氣攻則或用以牽牛三焦熱併則或用以補腎
 渴而喘則或用以竹茹熱而有痰則或用貝母
 熱而氣逆不舒則或用以青木香熱而渴閉則
 用乳車前石菖蒲久嗽兼脫則或用五倍子百
 煎乳水不通則或用以通草若更兼有血熱則
 當用生地紫菀此渴肺熱之大概也
 劑以瀉蓋以熱兼血燥犀角宜矣
 宜矣中虛煩起樓米宜矣暑熱宜生西瓜宜矣
 行不正賢聚宜矣痰熱毒盛人中黃金汁雪水宜
 矣乳癰痔漏漏熱宜矣乾宜矣便結不軟玄明粉宜
 呃逆竹茹蘆根宜矣腸毒不消宜刺蠅皮宜
 矣口渴不止竹葉宜矣若更兼有血熱則又宜於
 地榆槐角槐花蘇木三漆乾漆此渴胃熱之大

燕

海心

出而大腸熱結仍不外乎
 蝸牛生地之藥矣在心又有
 溺閉而用薑麥木通氣逆而
 用天竺黃昇陽而用西瓜精
 用釣藤咳嗽而用百合而用
 而更用犀角射干童便而用
 地黃金桃仁茜草蘇木丹參
 膽等藥又可按味以瀉則如
 在肝又有他劑以瀉則如肝
 鎮之腎氣不固則用石南葉
 用車前子以導之痰閉下醒
 弱木明則用秦皮空青蒙花
 以治之咳嗽痰逆則用全胡
 用蘆薈以段之濕鬱驚恐宜
 昏冒宜用赤芍使熱在於
 大約人肝涼血則有赤芍
 花地榆槐花槐所調栢葉
 尾血紫草夜明砂兔肉旱蓮
 草茅根蜈蚣山甲曉

解

解

解

解

錄

珎芙蓉花苦酒熊膽之類人肝破血則有莪朮紫
 貝靈芝紫參菰苴草黃血竭蓮藕古文錢皂莢
 歸尾鱉甲貫眾茜草桃仁之類人肝敗血則有三
 條蘇合中蟲蛇蟻瓦楞子大腹也而瀉膽之類皆
 審實以投此瀉肝熱之大機也而瀉膽之類皆
 豈有外空青銅秋銅青熊膽膽前用者藥者
 在腎又有他劑以瀉如龍膽防已為腎熱盛閉
 者所宜用也秋石為腎熱盛虛咳喘溺閉者所必
 用也寒水石為腎熱盛口渴水腫者所必用也
 骨皮為腎熱盛有汗骨蒸者所必用也為腎熱盛
 熱盛便閉者所必用也若使熱在於血則藥亦不
 瀉秘者所必用也若使熱在於血則藥亦不出乎
 童便地骨皮血餘銀柴胡蒲公葵生牛膝旱蓮草
 赤石脂自然銅古文錢青藍之類而瀉肝熱結
 其用猪苓澤瀉地膚子茵陳黃蘗黃芩龍膽川
 子藥者又可按其症治以考求矣此瀉腎藥之
 概也脾熱瀉藥無多惟有脾經血熱考書有用
 李射干紫貝母黃連葛根皂莢蠅蛭然亦須辨藥症

以治要之治病用藥須當分其臟腑然其是上是
不毫微之處未可盡拘如藥既入於肺者未有不
入於心入於肝者未有不入於脾入於腎者未有不
豈有浮左而不浮右重此而不重彼者乎但於形
色氣味重處比較明確則藥自有圓通之趣又奚
必拘拘於毫芒間互為較
衡而致錙其神智者乎

牽牛

蔓草

牽牛

入大小腸兼

有白有黑白者其性入肺黃於上

焦氣分除其濕熱故氣逆壅滯及大腸風秘者得

此以治黑者其性兼入右腎能於下焦通其澀澀

故腫滿脚氣及大小便秘俱得以治但下焦血分

濕熱濕自下受宜用苦寒以折。牽牛氣味辛辣。久
嚼雄烈服之。故能泄肺。若以下焦血病而於氣分
有損之藥。以為投治。是以血病瀉氣。不使氣血俱
損乎。呆曰。牽牛少則動大便。多則泄下如水。乃瀉
安在哉。故腫受濕氣。不得施化。致大小便不通。斯
宜用之。若濕從下受。下焦血中。之濕宜苦寒
泄之。傷人以辛藥。惟是水氣在肺。喘滿腫脹等症。暫
用以為開泄。俾氣自上達下。而使二便頓開。以快
一時。時珍曰。一宗室大人。年幾六十。平生苦腸結
不快。服硝黃通和藥。則苦悶如死。如此三十餘年矣。
時珍診其人。體肥。腹滿。面多黃。胃日吐酸。鹹盈盆。

許乃克又多火病此乃三焦之氣壅滯有升無降
 津微胃化為痰飲不能下滋臟腑非血燥比也潤
 劑留滯硝黃徒入血分不能通氣俱為痰阻故無
 效也乃用牽牛末皂莢膏丸與服即便通利自是
 但覺腸結一服就順亦若果下焦虛腫虛字選當
 不妨食且復精爽也
 佐以沉香補骨脂等味以為調補俾補瀉兼施而
 無偏啖損泄之害矣時珍曰外甥柳有素多酒色
 坐臥立哭呻吟者七晝夜醫用通利藥不效遣人
 叩予予思此乃濕熱之邪在精道壅脹隧路病在
 二陰之間故前四小便後則大便秘病不在太陽膀胱
 就也乃用揀實茴香穿山甲諸藥入牽牛加倍水
 煎服一服而取子濁去浮者春去皮得水香乾薑
 煅三服而取子濁去浮者春去皮得水香乾薑

大黃

音七
毒草

大黃

謂入
脾胃

大苦大寒。性沉不降。用走不守。謂入陽

明胃府大腸大瀉陽邪內結宿食不消

三承氣湯
皆有大黃

內入仲景治傷寒邪由太陽而入陽明之府者則用調胃承氣取其內有甘草之緩不令有傷胃府

之意也。治邪由陽明之經直入陽明之府者則用大承氣取其內有枳實之急得以破氣氣之壅也

治邪由少陽之經而入陽明之府者則用小承氣取其內無芒硝之鹹致令泄下以傷其胃也故

凡傷寒邪入胃府而見曰潮熱於申酉譫語班

狂便秘硬痛手不可近

喜按屬虛
拒按屬實及瀉熱瘧瘧下

痢赤白腹痛裡急黃疸水腫積聚留飲宿食心腹

痞滿二便不通與熱結血分一切瘕瘕血燥血秘
 實熱等症用此皆能推陳致新定亂致治故昔人
 云有將軍之號成無已曰熱論所勝以苦泄之大
胃然苦則傷氣寒則傷胃下則亡陰故必邪熱黃
 結宿食不下用之得宜宗頤曰有是證者用之無
須曰梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃
是以藥至尊年高不可得用帝勿從幾至委頓梁
武帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宜通
僧坦曰脈洪而實此有宿妨非川大黃無毒理亦
從之遂愈今醫用一膏藥而攻聚病偶中若使病
便謂之神不中不詭用藥之失可不戒哉若使病
 在上脘雖或宿食不消及見發熱只須枳實黃連

以消痞熱宿食自通若誤用大黃推蕩不下反致
熱結不消為害不淺時珍曰大黃病在五經血分
謂誅伐無過傷心陽有大黃治心氣不足吐血
血者乃真心之氣不足而心包肝脾胃之邪火南
餘也雖曰瀉心之實非四經血中之伏火也仲景
治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之
此亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發於陰而反下
之則作痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃
之上脘痞在於心故曰瀉心實瀉脾也素問云太
所致為痞滿又曰瀉氣在上則生瘧瘧是也病發
於陽而反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在
上脘分野仲景曰大陷胸丸皆用大黃亦瀉脾胃血
分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小
瀉胸湯邪滿在氣分則用半夏瀉心湯是矣或曰
心氣不足而吐衄何以不用補心而反瀉心蓋
曰心陰不足肺與肝能各受火而病作故黃芩救

肺黃連救肝肺者陰之上肝者心之川血之合也
肝肺之火既退則陰復其舊矣仲景傷寒論云太
陽病外症未解不可下脈浮大不可下惡寒不可
下嘔多者有陽明症不可下陽明病不能食或熱
必嘔陽明病應下反下之此為大逆太陽陽明合
病喘而胸滿不可下少陰病陽虛人脈弱者不可
下脈數不可下惡水者不可下諸四逆厥者不可下
下虛家不可下陽微不可下諸四逆厥者不可下
況先輩立藥治病原有成則如大黃枳實則瀉腸
胃之燥熱牽牛甘遂則瀉腸胃之濕熱巴豆硫黃
則瀉胃之寒結也雖其所逆則一而性質有不同
前為分視至於老人虛秘腹脹少食婦人血枯陰
虛寒熱脾氣痞積腎虛動氣及陰虛色白不起等

症不可妄用以取虛虛之禍川產鉅紋者良生用

峻熱川純忌進穀食

能得飲食通利

黃芩為使

連翹

黃芩

連翹

黃芩

味苦微寒質輕而浮苦雖載瀉六經

火然其輕清氣浮實為瀉心要劑

連翹形像似心但開有辨心

為火主心清則諸臟與之皆清矣然濕熱不除病

症百出是以癰毒五淋寒熱風痰癰惡瘡熱結

熱毒等症書載皆能以治

江蘇曰凡癰而痛者為實癰腫而不痛為虛邪

腫而赤者為熱結腫而不結者為氣聚飲

且經有言諸痛癢瘍皆屬

解心經
熱邪

降肝膽
外能風
我藥大
實經

心火連翹實為藥家聖藥也然多川胃虛食少脾
胃不足者慎之況消而無補癰疽潰後勿服火熱
由於虛者忌投

前胡

山草

前胡入肺味苦微寒功喘下氣凡因風入肝膽火

盛痰結氣實哮喘

氣有餘便是火

咳嗽嘔逆痞膈霍亂

及小兒疳氣等症升藥難投須當用此苦泄俾邪

去正復不似柴胡性主上升邪外出而無實痰

實氣固結於其中也按二胡均是風藥一升一降

用各不同。若使兼有外感風邪與痰火實結而用柴胡上升不亦如火益熱乎故必用此下降但症外感絕少祇屬陰虛火動並氣不歸元胸脇逆滿者切忌以其苦泄故也皮白肉黑味甘氣香者良半夏爲使惡皂莢忌火今有剉片以泥當歸片料可恨

白微

言出山草

白微

肺入

味苦而鹹性寒無毒凡人陰虛火動則

肉熱生風火氣焚灼身體壯熱支滿痰湧忽不知人與大汗出血厥酸痛淋閉其在婦人則或延孔

轉結通孔也婦人神無所依而見淋露不淨並血枯

熱勝而見虛煩上嘔非不用此苦泄鹹降利水使

陰氣自上而下則熱何由泄乎是以金匱安中益

氣竹皮丸用此以治婦人產中虛煩嘔逆經方調

經種子往往用之益不孕緣於血熱而少其源起

於真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也益陰清

熱則自生旺而有子矣須佐千金萎蕤湯用此以

治風濕身熱汗出身重又有白微芍藥湯以治婦

人遺尿白微芍藥等分酒調服不拘胎前產後皆能補陰平

也但胃虛泄瀉腸氣外越者禁用似生勝而短小
柔軟去麤酒洗用惡大黃大戟山茶薑棗

白欬

言主
茂草

白欬

尚人
肝脾

敷腫瘡瘍清熱解毒散結止痛久為外

科所用要藥然目赤驚癇溫癰陰腫滯下淋濁失

精金瘡失血凡因濕熱濕毒而成者何一不可以

為內科之用如金匱薯蕷丸用此以解風氣百疾

蘊蓄

張璠曰其湯全以桂枝湯和營散邪合理中
湯兼理藥誤君以薯蕷大理脾肺毫不及乎

補益

又書載同地膚子則可以治淋濁失精同白

芟則可以欬金瘡失血

故曰血熱

同甘草則可以解很

毒之毒豈盡癰腫解毒而已哉但此味辛入主散

味苦主降味甘主緩故止可以散結解熱若胃氣

虛弱癰疽已潰者均非所宜蔓赤莖有五葉根如

卵長有三五枚同窠皮黑肉白代赭石為使反烏

頭色赤為赤欬功用皆同

紫莖

言其熱草

紫莖

肺人

辛苦而溫色赤雖入至高之職仍兼下

降故書載入肺金血分

辛入肺赤入血

能治虛癆咳嗽

治肺記

悸吐衄諸血又能通調水道

若可以下降

以治溺滴便血

用此上下皆宜且此辛而不燥潤而不滯

李士材此為金

玉君子非多用於肺實為有益然疎泄性多培養

獨用不能速效桑白皮杏仁同為一類但桑白皮杏仁則

瀉肺經氣分此則專瀉血經氣分也故肺虛乾咳

禁用

乾咳類多血虛不宜再瀉

紫色潤軟者其人多以車前其

藥雖分上中與下然下疎泄尤甚蜜炒用款冬為

使白者名女燕入氣分大泄肺氣肘後方用此三

分鉛丹一分重酸漿服一刀圭日進三服至二十

一日能令面黑轉白過服不宜去頭鬚蜜水炒用
欬冬為使惡天雄瞿麥藁本遠志畏茵陳

蘆根
言老
蘆草

蘆根兼入肺胃治無他奇惟清肺降火是其所能

凡人胸中有熱則火升上咽逆氣不下脾肺熱起

則消渴便數甚至不能少忍金匱王幽治心膈氣

五兩到以水故必得此若寒以治則諸症悉除在

三大益其服日肺為水之上源氣散精上歸於肺始能通調

水道下輸膀胱腎以水腰而二便三經有熱則

小便數其半不能小忍火性急速故也蘆中空故

本草求真 卷六 醫熱 蘆根 實米

海狗
補腎
不止

其常道矣。且解鯢魚中毒酒毒然此止宜實熱不宜虛寒若誤用之必致見害取逆水土內甘美者效若露出水面者損人去蘆節

貫衆

言大
山草

貫衆

崙人
肝胃

卽俗稱爲管作者是也味苦微寒無毒

世遇天時行不正之氣人多用此置之水缸使人食之不染且不獨力能解毒凡遇胸中帶下並癰瘕斑痘中惡骨硬皆可用之蓋以苦能殺穢寒能散熱故也

以諸症皆
因熱成

昔王隱云一選方言食鯢魚

海經
風物

接爲骨所硬百藥不效或令以貫衆煎濃汁連進
一咯而出可見軟堅之功其殆若是之神矣形似
狗脊而大汁能制三黃化五金伏鐘乳結沙制汞
解毒軟堅

青箱子

言光
濕草

青箱子

言入
肝

卽雞冠花子者是也脩要又言卽草

决明味苦微寒無毒入足厥陰肝凡人一身風癢

虫疥得微口轉色青青白睛肺多綠熱盛風熾所

致亦有不盡風熱者舊言服此日疾皆愈唇青卽
此則專就風熱言

本草求真

卷六 雜藥 青箱子

十一

清熱
解毒
降火

散三蟲皆殺風癢卽絕無非因其血熱除寒能勝熱血

脉和而病自可愈耳無他義也但墮子散大者切

忌以能助火類鷄冠而穗尖長搗用

竹茹言竹苞木

竹茹音入味甘而淡氣寒而滑凡因邪熱客肺肺

金失養而致煩渴不安肺虛嘔逆惡阻嘔吐吐血

衄血等症若皆當服此諸病皆就肺胃熱論蓋味甘則中可

安而煩不生味寒則熱得解而氣悉寧又皮入肺上焦溫肺

之湯用所以金匱之治產後虛煩嘔逆則有竹皮大

凡千金之治產後內虛煩熱短氣則有甘竹茹湯
竹茹一升甘草茯苓黃芩各二兩水煎服產後虛煩頭痛短氣悶亂不
解則有淡竹茹湯皆有至理內存不可不知取竹
刮去外膜取二層如麻縷者良

淡竹葉

音公
苞木

竹葉

音人
目心

體輕氣薄味甘而淡氣寒微毒據書皆

載涼心緩脾清痰止渴為治上焦風邪煩熱咳逆

喘促嘔噦吐衄一切中風驚癇等症

果曰除新入
風邪之煩熱

止喘逆氣無非因其輕能解上卒能散鬱甘能緩

海唇
淡竹
葉

脾涼能入心寒能療熱故耳然大安總稱利之

品合以石膏同治則能解除胃熱而不致煩渴不

止也藥生竹上故治上焦仲景治傷寒發熱大渴

邪竹生一年嫩而有力者良心對

天竺黃也木

天竺黃入係天竺國之竹精氣結成其粉形如

竹節味甘氣寒與竹瀝功用畧同皆能逐痰利竅

但此涼心去風除熱為小兒驚癇風熱痰湧失音

較之竹瀝其性和緩而無寒滑之患也味甘今市

海心

肆多骨灰葛粉雜入不可不辨

秦皮

三台
喬木

秦皮

齒入肝
膽腎

味苦氣寒色青性瀉功歸入肝以除

熱入腎以瀉氣是以因風而見濕痺驚癇目障之

症者則當用此苦燥苦降之味以除因脫而見崩

帶腸澼下痢之症者則當用此收瀉寒氣以固如

仲景白頭翁之用秦皮苦瀉之類

白頭翁黃蘗黃連秦皮等分

老子云天道貴瀉惟瀉故補服此不惟泄熱止脫

而且益腎有子矣至治赤眼腫痛則合黃連等分

頻點並秦皮一味煎湯以洗甚効或加滑石黃連等分出外禁熱
要但此氣寒傷胃總不宜於胃虛少食之人耳
西上皮有白點漬水碧色書紙不脫者真大戟為
使惡吳茱萸

川練子

言俗
商水

川練子

品入心包
小腸膀胱

即苦練子因出於川故以川名

又名金鈴子練實者是也味苦氣寒微毒凡人冬
時感冒寒邪至春而發則為溫以致症見狂燥並
疝瘕熱被寒束症見囊腫莖強掣引作痛與夫寒

熱積聚

積由五臟所生

三蟲內蝕者俱宜用此調

治

有虫耗其津液而渴須用此根葉加鹽以投

以苦主有泄熱之功寒

有勝熱之義故能使熱悉除而毒蟲瘕疝亦得因

其自心下降出於小便而乃泄矣但人止知此為

除疝之味

內經七疝曰瘕曰瘕曰瘕曰瘕曰瘕曰瘕曰瘕

而不知有逐

熱解狂之力以致廢而不治即其治疝亦不分其

是寒是熱是偏是平與夫偏有錯雜多寡之異其

痛亦不分其所痛之處是否自下而上從上而下

治病要惟計古方茜香川練歷為治疝千古組豆

詎知疝屬於熱則痛必見囊腫莖強其痛亦必從下而上川以川練內入以爲嚮導則熱可除熱疝必用如其疝並非熱其痛自上而下痛引入腹且有厥逆吐瀉非用辛溫不能見效若以川練同入則於理不免岐而二矣寒疝不然古人立方治疝偏以川練同投其意奚似蓋緣邪有錯雜則治不得不爾若以錯雜之邪而概川以辛燥不更使病相左乎繡嘗語諸同人凡人用藥治病須當明其偏平偏症偏治平症平治錯雜多寡不一之症則卽當

以錯雜不一以治病種類背繡治一族叔字次周

陰疝其症是偏不平毫無一症混雜乃有附城一

降必執古方用以川練繡謂病症不雜何須用是

然終謂其古方所用川練稽書何無一語活動間

有指屬反佐亦無一語申明以致衆混不解書不盡言

繡只據理投服隨手輒應而不爲方所執及閱張

璐本經逢原其辨川練功用分爲陰陽二疝及有

錯雜之邪必用川練之說始嘆理道本同而古人

屢我而獲繡益信已所治族叔之病而不敢

用川練者未始不有理存而竟所揆而如一也
 易否則幾為古方所誤矣故凡疝因熱邪及因蟲
 虫內傾宜於川練若使脾胃虛寒症屬陰疝則川
 練其切忌焉練以川產為正去皮取肉去核以根
 有雌雄二種雄根色赤無子大毒忌火雌根白子
 多微毒可搽去青留白單味酒煎按服殺蟲治瘡
 煎湯洗之可治中熱即時吐出茴香為使

蒙花

百金
木

密蒙花

肝
入

因冬不開花開蒙密故以蒙名甘而

治暑

微寒功前入肝經除熱養營蓋肝開竅於目目得
血而能視虛則青盲膚熱則赤種淚淚目中赤
脉及小兒痘瘡餘毒肝氣攻眼得此甘能補益寒
能除熱肝血足而諸症無不愈矣然味薄於氣佐
以養血之藥更有力焉取蜀中產者良酒浸一宿
候乾蜜拌蒸晒三次

柿蒂 音公山集

柿蒂 音公山集 入味苦氣平 時珍謂其雖與丁香同爲止

呃之味然一辛熱而一苦平合用深得寒熱兼濟

欬
欬
欬

藥

和
和
和

保國書

之妙醫通本草謂濟生方治呃逆專取柿蒂之酒
寒如係有寒無熱則丁香生薑之辛以散外傳之
治必常佐以柿蒂有熱無寒則柿蒂在所必需不
得泥以兼濟之必雜以下香是以古人用藥有合
數味而見效者有單用一味而效者要使藥與病
對不致悖謬而在施耳竹茹蘆根則柿霜清肺
胃之熱能治咽喉口舌疼痛風痔漏然必元氣
未離始可投服若虛煩喘嗽切忌柿乾同於柿霜
但力少緩俱忌服

梨三百七
山菓

梨入肺胃。成於秋。花皆白。得西方金氣之最味。苦微

酸。氣寒無毒。功喘人肺。與胃。凡胸中熱結熱嗽痰

咳便秘狂煩咽乾喉痛中風因熱反胃不食反胃

熱成有因寒並湯火傷瘡癰疽目障丹石熱氣一

切屬於熱成者。惟食梨數枚。即能轉重為輕。消弭

於無事。絲絲反胃轉食藥物不下用大雪梨一個

力治小兒風熱昏憒燥渴不能食。用消梨三枚切

破同梗米煮粥。以食時珍曰。按類編云。一士人狀

若病疾厭厭無聊。行謁楊吉老。診之曰。君熱症已

極。氣血消燄。此去三年。當以疽死。士人不樂而去。

聞茅山有道士醫術通神而不欲自鳴乃衣僕衣
詣山拜之履執薪水之役道士留置弟子中久之
以賣白道士道士診之笑曰汝便下山但日日喫
好梨一嚥如生梨已盡則取乾者泡湯食滓飲汁
疾自當平士人如其戒經一歲復見吉老見其顏
貌腴澤脉息和平驚曰君必遇異人不然豈有痊
理士人備告吉老吉老具衣冠望茅山設拜自咎
其學之未至此與瑣言之說彷彿脫夫二條則梨
之功豈小補哉然惟乳梨膏梨消然必元氣素虛
梨可食餘梨則亦不能去病也
大便素堅方可與食及痢川梨者當斟酌之惟病
瀉煩渴人食之甚佳終不能却疾
若使元氣虛弱悞喫多致寒中
蓋梨是冷利之物服之中益寒冷金瘡乳婦亦忌
投服恐血得寒益凝豈可慨謂能食而不寒而別

之乎搗汁熬膏良葷汁蜜製消痰止嗽用萊菔與梨相間收藏則不爛

西瓜 言入

西瓜

肅入心胞胃

內穰今人遇值三伏天燥不論男婦

大小朝夕恣食誠以燥渴之極得此味甘色赤能

引心胞之熱下入小腸膀胱而出令其心胸頓冷

煩渴冰消故書載治太陽膀胱陽明胃中暍及熱病

大渴等病宜投如春溫發熱等症並有天生白虎湯之譽

惟是藥氣素厚遇熱消渴及伏氣發瘟得此如湯

滌雪若以脾胃素虛恣服轉渴朝夕恣食必待膈
滯上湧或瀉或腫或脹元陽已削方爲覺謬悔莫
及矣衛生歌云瓜桃生冷宜少食免至秋來成瘧
痢又瓜本寒曝之寒氣益聚而寒矣猶之油炒本
熱經火煎焚則其性稍革而不熱矣因述此以爲
好食瓜者一箴

銅青

金匱

銅青出入卽俗所云銅綠者是也與空青所產不
同銅青氣稟地陰英華外見耕醋結成故味苦酸

海石 音平

清氣寒能入肝膽二經按酸入肝而欬所以能合
金瘡止血苦寒能除風熱所以能去膚赤及鼻癰
肉苦能洩結所以醋醃喉中則吐風痰而使血氣
心痛皆止為散能療喉痺牙疳醋調搗腋下治胡
臭薤汁調點爛沿風眼鋪半川黃川連三錢杏仁
分膽繫一分銅青三分大凡疳殺虫所治皆厥陰
元氣一救水煎乘熱搽眼人之疳實
之病時珍曰吐痰須觀人可投之

海石 音平

海石 肺入即書所云浮石者是也其石係水沫結

本草卷之七 石部 海石 音平

散上蓋
積聚
下焦
塊

成浮於水上故以浮名色白體輕味鹹氣寒時珍曰其
質玲瓏肺蓋既有升上之能復有達下之力其白
之象也。能治上焦痰熱目翳痘癰者以其氣浮上達之謂
也能治諸淋積塊癭瘤者以其鹹潤軟堅之意也
余琰庸上腐談云肝屬木常浮而反沉肺屬金常
沉而反浮何也肝實而肺虛也故石人水則沉而
南海有浮水之石木人水則浮而至於實則宜投
虛則忌服者以其忌有尅削之氣也味鹹者良根
過水飛用

圭青

二九
石

肝經
外經
肝經

空青

肝人

感銅精氣而結故耑入肝明目蓋人得

水氣之清者為肝血其精英則為膽注開竅於目

血者五臟之英注之為神膽汁充則目明減則目

昏銅亦清陽之氣所生其氣之清者為綠猶肝血

也其精英為空青之漿猶膽汁也其為治目神藥

蓋亦以類相感耳

出時

況人多怒則火起於肝水

虛則火起於腎故生內外翳障得此甘酸大寒以

除積熱及火兼之以酸則火自斂兼得金以平水

故治赤腫青盲其空青所含之漿可取點眼設亦

磨翳要藥書云不怕人間多暗眼只愁世上無空

青但空青中永久則乾必須驗其中空內有青綠

如硃者卽是如無綠青亦可不必拘泥

聖濟錄治黑翳眼

用空青雜石燒各一所貝子四枚研細日點

石青言九石

石青

兼入胃肺

甘辛而涉體重而降其性大寒功

能入胃清熱解肌發汗消澀綠傷寒邪入陽明胃

府內鬱不解則必日晡熱蒸口乾舌焦唇燥堅痛

不解神昏譫語氣逆驚喘溺閉渴飲雖中晷自汗

胃熱發斑牙痛等症皆當用此訓治成無已曰風邪也風傷陽寒克傷陰營衛陰陽為風寒所傷則非輕劑所能獨散必須輕重之劑同散之乃得陰陽之邪但去營衛之氣俱和是以大青龍湯以石膏為使石膏乃重劑而又專達肌表也以辛能發汗解熱且能緩脾益氣生津止渴寒能清熱降火故也按石膏是足陽明府藥邪在胃府肺受火制故必用此辛寒以清肺氣所以有白虎之名肺主西方故也泉曰石膏是陽明藥也故仲景治傷寒陽明症身然且痛口乾不眠以身以前胃之經也胸前肺之室也但西有邪在陽明肺受火制所以有白虎之名但西有肅殺而無生長如不得已而用須中病即止切勿

過食以損生氣

時珍曰此皆少壯肺胃火盛能食而病者言也若衰暮及氣虛血虛

胃弱者悉非所宜

况有貌情熱症裡屬陰寒而見斑黃狂

燥口瞀潮熱便秘等症服之更須斟酌惟細就實

明辨詳求其真可也

汪昂曰按陰盛格陽陽盛格陰二症至為難辨蓋陰盛極而格陽於外外

冷而內熱經所謂重陰必陽重陽必陰重寒則熱

重熱則寒也當於小便分之便清者外雖燥熱而

中實寒便赤者外雖厥冷而內實熱也再看口中

之燥潤及舌胎之淺深胎黃黑者為熱宜白虎湯

亦有胎黑屬寒者舌無芒刺口有津液急宜白湯

誤投寒劑則殆矣又按熱在胃熱症見斑疹然必

色赤如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹斑重而

疹輕斑疹亦有陰陽陽症宜石膏又有內傷陰症

見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛誤其無根之

見斑疹者微紅而稀少此胃氣極虛誤其無根之

火遊行於外。黃帝益氣血。腹中有主。則氣不外。游血不外。散若作熱治。生死反掌。醫者宜審。瑩白者良。亦各寒水石非鹽精。入研細。或甘草水飛。或火煨。各隨本方用。鷄子為使。忌豆、鐵。

青鹽 三石

青鹽 端入腎 即名戎鹽。稟至陰之氣。凝結而成。不

經煎煉。生於涯涘之陰。其味鹹。氣寒。無毒。能入少

陰。腎臟以治血分實熱。故凡病因腎起而見小便

不通。胃中痰赤。瀉昏及吐血。溺血。齒舌出血。牙齦

熱痛。既蠱毒邪氣。因結不解者。宜以此味投治。普

方治風眼爛弦川戎鹽化水熬之仲景金匱方治
小便不通用戎鹽彈丸大一枚茯苓半觔白朮二
兩水煎服之仰腎補而熱除鹹入而堅軟經曰熱淫於
內治以鹹寒正此謂耳出西羌不假煎煨方發明
潤色青者良

食鹽

苦鹹石

鹽前人之品類甚多有生海江淮生池山生井

四川生土戎生階光明生石石生樹水生草蓬之

各異然寒氣味則一蓋鹽味鹹氣寒加以皂角同

煎則味又兼微辛五味性鹹潤下故凡大小便閉

者得此則通五味惟鹹走血故凡血熱血痛者得
此則入五味惟鹹入性故補腎藥必常鹽湯送下
而諸骨筋痛藉此則堅竹消筋緩皆因熱所致
譬如生肉易消得鹽性寒鹹則能堅五味惟鹹潤
久不壞時珍曰腎主骨鹹入骨也五味惟鹹潤
燥而辛又能泄肺故凡痰飲喘逆得此則降時珍
藥川之者鹹引水聚也五味惟鹹軟堅故凡結核
能取豆腐與此同煮五味惟鹹軟堅故凡結核
積聚得此則消五味惟鹹補心故凡病因心起而
見喜笑不休則惜用此沸飲過止亦用鹽煨赤而飲
至於癰腫惡毒眼目暴赤酒醉顛狂湯火急迫凡

卷之三

三

其因熱而起者無不藉此以寒勝熱王而使諸症

其悉平矣但鹹雖能走血多食則血即凝鹹雖下

趨過鹹則反水上吐所以齁亂臭毒頭疼腹痛等

症則可引涎上咽而吐之也水腫如何忌食恐其

以水助水之意也橫生逆生如何用鹽即便縮入

正產千金方用鹽摩產婦臍并以其力有上歸之

意也水蛭蚯蚓及蟻如何得此即化經方浙西

此每夕蚯蚓鳴於體一借以其高石以水濟火之

意也孫真人治喉中生肉用綿裹齒頭用鹽指之

且五六度應惠方治齁齁喉風腫長半寸服

海味
熱邪
結

食鹽類
之即消
多食如何口渴以其滲去胃中津液也

朴硝
音杲

朴硝
謂人腸胃即皮硝生於鹵地刮取初次煎成

為朴由朴再煎為性最陰善於消物故以硝

名其味苦而日辛片五金八石用此俱能消除况

人臟腑積聚乎然必熱邪深固閉結不解用以蒸

鹹以為削伐則藥與病符自不見問時珍曰硝稟

之子也氣寒味寒走血而潤下熱淫魚腸胃實

熱腸強之病乃治火邪藥也好古曰硝利小便便

而墮胎然傷寒妊婦可下者用此並大黃引之並

人大腹潤燥堅渴熱而母子俱安詳云有故無

殞亦無殞也。此之謂歟。以下言之。則便溺俱陰。以前後言之。則前氣後血。以腎言之。總主大小便。難溺澀閉結。俱為水少火盛。成無已曰。熱滯於內。治以鹹寒。佐之以苦。故用芒硝。大黃相須為用也。汪昂曰。豐城尉家有猫子死腹中。啼叫欲絕。醫以硝灌之。死于卽下。後有一牛亦用此法得活。如仲景大陷胸湯大承氣湯調胃承氣湯之類。雖其用有大黃可以除熱。然亦不得不假軟堅之藥耳。若使病非實熱。及或熱結不堅。妄用承氣。朴硝等以為消削。其不傷人性命幾希。唐時皓日賜羣臣紫雪紅雪碧雪皆用此硝鍊成者。通治積熱諸病有神效。貴在用者酌中爾。但朴硝初煎性急。芒硝久煎差緩耳。大黃為使。

玄明粉

二百五十五

玄明粉

端人係

芒硝再煎而成其色瑩白辛甘而

冷功川等於芒硝皆有軟堅推陳致新之力

陳不除則

因通用之意若熱閉不解亦當用此下奪然煨過

多遍其性稍緩不似芒硝其力迅銳服之恐有傷

血之虞耳

王好古曰玄明粉治陰毒一切非伏陽

時珍曰神農本草言朴硝鍊創服之輕身神仙益

在以上氣入之言發人因此制為玄明粉煨鍊多偏

滿少年氣壯者量與服之亦有速效若脾胃虛冷

及陰虛火動者服

若佐甘草同按則膈上熱痰胃

中實熱腸中宿熱又克見其治矣兼洗眼目消腫

續族兄式和用玄明粉搽服初覺一二次甚明召

續同搽續端服病非熱不得用是因未允越後疾

兄屢療屢廢始忌苦參

信余言不謬

寒水石 言石

寒水石 謂入又名凝水石又名白水石生於幽地

因鹽精滲入土中久結聚清瑩有稜而成也味

辛而鹹氣寒無毒書載能治時行大熱口渴水腫

蓋以性稟純陰故也經曰熱淫於內治以鹹寒又

曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以收之服此

利水

治熱利水。適相宜耳。永類方男女輕唇不得小
一合水煎。卽利。易簡方。湯火傷。用寒水石。燒。兩。散。
經驗方。小兒丹毒。皮膚熱赤。用寒水石。半兩。白土。
醋調塗。然此止可暫治。有餘之邪。及發湯火水。
傷。若虛人熱浮。其切忌焉。瑩白含之。卽化者真否。
卽是偽。但真者絕少。

雪水

言欠
天水

雪水

謂入

氣藥太陰水。極似土。雖於冬時置而不

問。然值傷寒陽毒瘟疫時。毒內熾。並盛夏暑

熱內淫。而見燥熱。殆甚者。並可用此調治。

宗廣曰
脂雪水

大寒之水也故且能以解燒酒諸毒是以書載凡
治熱症可用塊置於兩乳之間且云宋徽宗因食
冰過甚致病醫士楊介仍以水煎諸藥以治其源
深得用水義耳因知病因冰起還以冰解之也

孩兒茶 音九

孩兒茶 備人 味苦微清性涼無毒功治清上膈熱
化痰生津收濕涼血生肌凡一切口瘡喉痺時行
瘟瘡煩燥口渴並一切吐血衄血便血尿血血痢
及婦人崩淋經血不止陰疳痔腫者服之立能見

殺出南薑是細茶末入竹筒埋土中日久取出搗
汁熬成塊小潤澤者上大而枯者次之真偽莫辨
氣質莫考用宜慎之

熊膽 三百

熊膽

尚人心肝養人脾大腸

味苦性寒無毒功尚涼心平肝

惟其涼心所以能治心痛症忤熱邪等症惟其平
肝所以能治目赤翳障惡瘡痔漏等症且能入脾
而治黃疸濕邪入大腸而治久痢疳積濕熱并治
小兒風痰壅塞發作驚風要皆除熱涼血而病自

愈耳魚膽相近首夏在腹秋在左足冬在右足能
詩以男此只可作丸勿煎湯通明者佳但以
之多水中通善辟塵撲塵水上投膽少許則
摩磨而開又取少許研滴水中掛如線直至水
底不散者真

鰓魚膽

三百一

鰓魚膽

人

即屬烏鰓又名七星魚者是也其物

伏上勝水味甘性寒無毒凡人身患十種水氣垂
死可用肉與冬瓜慈白以治且煮湯浴兒可以稀

藥性論
心經
肺經
肝經
脾經
胃經
大腸經
小腸經
膀胱經
腎經
膽經
三焦經

石決明

蚌蛤

義反魚之

洪北知臣禮人無禮
天地鬼神皆不喜

之亦可

首有七星夜朝北斗道家謂之
天厭大為地厭衛生歌天雁行有序
大有

之終若比喉痺將死者點人即愈病深者水調灌

易膽味苦雖較甘

甘日華曰諸魚膽苦惟此屬然
甘可食為異也脂月收收然膏

出痘時則未洗處偏多也此乃異人所傳不可輕
歷以清水洗去也若不信但留一手一足不洗遇
豆小者二三尾煮湯浴兒遍身七歲俱利不可

石決明

蚌蛤

一名千里光得水中陰氣以生其形

如蚌而扁味鹹氣寒無毒入足厥陰肝經除熱

磨礬消障之品。緣熱熾則風必生。風生則血被風
阻而降。以起久而固結不解。非不用此鹹寒軟堅
逐瘀清熱祛風。則熱何能祛乎。故本事真珠母丸
與龍齒同用。皆取清散肝經積熱也。但此須與養
血藥同入。方能取效。且此氣味鹹平。久服消伐過
當。不無寒中之弊耳。亦治骨蒸勞熱五淋。汪昂曰。能清肝
肺。故研細水飛點目。能消外障。痘後眼翳。可同殺
也。精草等分。細研。猪肝蘸食。卽退。七孔九孔者。良醫
水。旋迴製熟。爲末。水飛。惡旋覆。

珍珠

珍珠

即蚌所生之珠也珠禀太陰精氣

論最詳。謂其功用多入陰經。其色光明。其體堅硬。

大小無定要以新完未經鑽綴者爲尚味甘微鹹

氣寒無毒入乎少陰心經足厥陰肝經蓋心虛有

熱則神氣悍遊肝虛有熱則日生翳障

肝目
藥爲
除
二

經之熱故能鎮心明目也耳聾本病腎虛有熱耳鳴

甘寒所以平之逆膈者膈脹也胸腹氣逆脹滿

以及手足皮膚皆腫也。經曰：諸濕腫滿皆屬脾土。諸消脹大皆屬於熱。此脾虛有熱，兼有積滯所致。珍珠味甘，既能益脾，寒能除熱，體堅復能磨積消滯，故亦主之。珠藏於澤，則川自媚，況塗於面，寧不令人潤澤顏色乎？至於疔癰癰腫、長肉生肌，尤臻奇效。但體最堅硬，研如飛麵，方堪服食，否則傷人臟腑。外搽肌肉作疼，蚌蛤無陰陽牝牡，須雀化成，故珠獨一於陰精也。

金汁謂人係取糞入罈埋於土內三年取出塗消
如水者是耳味苦氣寒置於土中時久得其土氣
最厚故能入胃大解熱毒凡濕熱時行毒勢衝迫
勢危莫制者用此灌之下咽稍減以其氣味相投
故能入人其巢而破其毒耳解即初生小兒周時
內毒氣方張用此服一二分既能化毒且能免後
痘疹此最靈驗但稟體氣寒體瘦色白者不可誤
用恐其反奪天真耳不可不審審花用此最良

秋石

三百五
人

秋石端人本於人溺因秋露水摻澄晒乾刮取而

成故名秋石味鹹氣溫揚書載能滋陰潤臟退熱

軟堅治癆止嗽通溺利便瀉精固氣且云經火煨

煉去其鹹寒性為溫補溫而不燥潤而不滯清不

損元降不敗胃為滋陰降火之聖藥為精火兩然

補竊謂補處少而清處多溫處少而寒處多溫止

火取而非濁中濁氣虛勞火重服此似不甚碍其

具有清火開有微功亦非補中正劑補中惟參耆

之性耳滋水惟地菜乃若使氣薄火衰水泛縱經煨煉終

補中止劑耳

蔡

不免有虛虛之禍矣

大黃經總類煉亦不能以他

也法於秋時取童便每紅用石膏七錢桑攪澄傾

去清液如此二三次乃入秋露水攪澄如此數次

穢淨鹹減以重紙鋪上晒乾刮去在下重濁取輕

清爲秋石再研入罐鍊盡凝定鹽泥固濟升打升

起盞上者名秋水味淡而香乃秋石之精英也

本草求真卷第六 第一冊終

本草求真卷六 第二册

臨補肝其黃絲生其補肝是
生其補肝是

濕火趙養葵曰：始火者立命之本，為十二經之主。無此則三焦之氣不能以作強而伎巧不出矣。勝此則不能腐水穀而五味不出矣。肝膽無此則將車無決斷而謀慮不出矣。大小腸無此則變化不行。而二便閉矣。心無此則神明昏而萬事不應矣。治病者，的宜以命門真火為君，主而加意以火之一字觀此，則火不立，渴也明矣。而丹溪又言氣有餘便是火，使火而果有餘，則火亦能為害。烏在而不渴乎？惟是火之所發，本有其基，藥之所至，自有其治。氣味不明，則治罔不差。如大黃是渴，附火之藥，故便閉硬痛，其必用嗎石膏芽根是渴，附胃之藥。

本草求真 卷六 渴火 三三

口渴藥熱其必用芍黃芩生地是瀉肺火之藥
 熱血燥救各呈焉火盛則痰與氣交室是有宜於
 祀萎花粉火盛則水與氣必阻是有宜於桑白皮
 火盛則智必蒸是有宜於梔子火盛則肺化源不消是有
 然皆非是有宜於梔子火盛則肺化源不消是有
 宜於天冬寒火盛則心狂越燥亂是有宜於
 羊角火盛則氣必逆而喘是有宜於竹茹此非同焉
 則必扶胃火氣上呃是有宜於竹茹此非同焉
 瀉之藥乎黃連犀角是瀉心火之藥也燥熱蒸
 時要研黃連各著馬大處則小腸必燥是有宜於
 木通瑩草火盛則喉必嘶而有宜於熊膽火盛則心必
 火盛則目必翳而癢是有宜於熊膽火盛則心必
 煩燥懷懷是宜於梔子火盛則肺失其所養是有宜於
 有宜於竹葉大癰則肺失其所養是有宜於
 火盛則血必妄沸是有宜於黃芩此非同焉
 鬱時懷是有宜於黃芩此非同焉
 於青黛肺草號為瀉肝之火然必果有實熱實火
 者方宜若止瀉火而見抽掣則鈎藤有難療矣因

黃芩
三百六

火而見目障則熊膽其莫除矣因火而見驚癇骨痛則見背蒸
 其必用矣因火而見口舌諸瘡則人中白其必進
 矣因火而見胸疾斑毒喉痺則大青其必同為
 火而見寒熱往來則黃芩其必用矣此非同為
 肝之川乎而磨火之必用以磨草大青青黛者
 思若在腎火症見骨蒸勞熱不得不用黃藥症
 咽痛不止不得不用玄參症見楊梅惡毒不得
 用胡連症見頭目不清痰涎不消不得不用茶
 症見水留骨節不得不用青蒿草症見無汗骨
 不得不用地骨皮此非同為濕腎熱乎而勝火
 起之必用以人中白童便及三焦火起之必
 青蒿草施于者又自可驗諸火之渴當分臟腑
 此但川而不顧其病症之符藥氣之合則其
 最鍊可不深
 思而長慮

本草

卷

大

三

三

三

黃芩

入肝入心脾肺經書載味苦入心又載入肺

火入脾除濕入大腸以治腸澼腹痛痢為腸澼凡

病屬於熱則其形氣堅強脈必滑實有力身則長

熱喜冷不欲衣被渴則喜好治水愈涼愈快隨飲

隨消小便便熱赤瀉痛不堪下痢純紅痛則輟飲

按并或頭疼身熱筋骨痠痛此其症之實者也病

屬於寒則其形體薄弱顏色青白脈雖緊數而無

力無神脈即真弦而中虛似實血則微紅不鮮及

或難有紫紅紫白屋漏水形所下之物或黃或赤

淡不甚臭穢痛則不欲食或胃脘作嘔而多不酸或

或胸腹如饑而不出或口雖渴而不欲飲冷飲冷而

不欲咽此其入小腸膀胱以治淋閉曰治中焦實

症之虛者也入小腸膀胱以治淋閉曰治中焦實

火及邪在小腸膀胱得此以為清理一藥而上下

表理皆治其功乃之泛涉始有難為請至者耳不
知內火衝激外邪傳入皆能恣害上如胸膈咽喉
下如肚腹二便中如表裡之所陰陽之界無不病
症悉形以故腹痛腸澼寒熱往來黃疸淋閉
胸高氣喘癰疽瘡瘍火嗽喉腥經閉胎漏口渴津
枯一皆濕之所滯熱之所浸火之所勝提出為結
病之黃芩味苦性寒枯而大者輕飄上升以清肺
肺清則痰白理矣注昂曰痰因火動常先降火實而細者沉重
下降以利便利則腸澼自去酒炒則膈熱可除

而肝膽火熾生用則實熱堪投而腹痛斯愈時珍
景治少陽症小柴胡湯大陽少陽各病下痢黃芩
湯少陽症下後心下滿而不痛瀉心湯並用之蓋
黃芩味若氣寒色黃而結潤心火而除則濕俾金
不授胃人上則故能收膽少陽之症難曰病在生
表半裡為胸脇痞滿實兼心膈上焦之邪心煩喜
嘔然點不欲飲食又兼脾胃中焦之症故用黃芩
以治手足少陽相火黃芩亦少陽木經藥也楊士
藩直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡
之退熱乃苦以發之散火之標也黃且得白朮
芩之退熱乃寒能勝熱折火之木也
仁以安胎得厚朴黃連以除腹痛得芍藥以治
得柴胡以治寒熱往來此雖合上與下表裡皆治
而究止為上中二焦瀉火除熱與濕之味矣楊士

熱身如火療煩燥引飲而盡者自一味黃
 芩湯以潤肺經氣分之火方用黃芩一兩
 虛腹痛結寒者切忌時珍曰肺虛不宜者苦黃明
 者良中虛者為枯芩即片芩內實者名條芩即子
 芩上行酒炒瀉肝膽火猪膽汁炒山藥龍骨為使
 銀丹皮丹砂

黃連

山草

黃連

苗入心兼入腸胃脾

大苦大寒據書所載治功脩極表

著且以別錄中有厚腸胃一語互為傳播以至於
 今謬尤莫關貽害無窮詎知黃連止屬瀉心之品

除濕之味心者其黃湯脾也黃則渴其子也

云腸辟能止口乾能除痞滿腹痛能消癰疽瘡瘍

能愈肝虛能鎮與夫婦人陰蝕小兒疳積並火眼

赤痛吐血衄血諸毒等症無不由此調治亦何莫

不因濕熱火退而言豈於濕除火退之外尚有治

效之著哉元素曰黃連其用有六濕心火一也

濕四也赤眼暴發五也山中都見血六也朱震亨

曰下痢口熱燥口者用黃連人參煎湯終日呷

之如吐再強候但得一呷下嘔便好劉完素曰古

方以黃連為治痢之最蓋治痢惟宜苦寒藥辛

能發散開通情結若能燥濕寒能勝熱使氣宣平

而已諸苦寒藥多潤惟黃連黃蘗性冷而燥能降

火去濕而止瀉痢故治痢以之爲苦。景曰凡眼暴
發赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿
食不消心下痞滿。況此性稟純陰在人腸胃素厚
者須用黃連枳實。挾有燥濕火熱服之過多尙有偏性爲害而致胃
陽頓絕生氣漸滅。宗真曰今人多用黃連治痢蓋
參泄微似有血便卽用之又不顧寒熱多少惟欲
盡劑由是多致危因時珍曰黃連大苦大寒之藥
用之降火燥濕中病卽當止豈可久服使肅殺之
令常行而伐其生發冲和之氣乎。秦觀與喬希聖
論黃連書云聞公以眼疾稱黃連至十數兩猶不
已殆不可也。醫經有久服黃連苦參反熱之說此
雖大寒其味至苦入胃則先歸於心。矧有脾陽素
久而不已心火偏勝則熱乃其理也。弱因此一言流播而可恃爲常服者乎。今人一見

火熾不滅是寒是熱是虛是實輒以取投以致偏

勝貽患貽受天折殊堪嘆惜時珍曰黃連治目及

香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連髮通散

用黃連治伏暑用黃連治下血用黃連大蒜治

黃連治伏暑用黃連治下血用黃連大蒜治

熱一陰一陽寒熱互用之意而無偏勝之害汪

火石黃連湯心火佐以龍膽瀉肝勝火白芍湯

火石黃連湯心火佐以龍膽瀉肝勝火白芍湯

之補按柴胡瀉肝膽火黃連佐之酒三焦火黃連

用此愈增其辛山四川瘴小狀類鷹爪連爪連珠

矣不可不知

名良薑汁炒心火生用鹽火醋炒肝膽火猪膽汁

炒上焦火酒炒中焦火薑汁炒下焦

大急症
腦熱
邪火熱

火鹽水炒或童便炒食積火黃土炒濕熱氣
分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒服亦入乳黃連

芩龍骨為使惡麝花玄參殭蚕白鮮皮畏款冬花

牛膝忌猪肉亦有不忘者如臙連
九黃連猪肚丸之類

胡黃連
三百八
山草

胡黃連
肅入臙
出於波斯國近時秦隴南海亦有

氣味功用亦同黃連因以連名但此性尚達下太

伐臙腑骨髓添火熱邪凡骨髓勞熱五心煩熱三

消五疳溫瘧瀉痢惡毒等症皆得以治
經目心接

臙消是渴而多飲上消肺熱症也又曰二陽結而
為消是多食善饑中消胃熱症也消而小便數有

膏為下消腎熱症也又按經言痔因飽食經脈積
解馬痔為痔又言腎脈生病痔漏又按書云痔者
牝痔牝痔無所施洩則逼肛門而為痔腫故同
傷於血分無所施洩則逼肛門而為痔腫故同
猪腰以療楊梅惡瘡且同乾薑以治小兒菓積同
鵝肝以治小兒疳眼同烏梅以治小兒血痢同甘
草猪腰以治微瘡又治婦人胎蒸候之黃連治功
同而稍異耳但小兒腎嗽不足脾胃虛寒者其切
忌焉心黑外黃折之塵出如烟者真嬰惡同黃連

知母
三百九
山草

知母
諸人入肺
辛苦微滑能佐黃蘗以治膀胱熱邪

治肺火
供熱利
以清化

緣人水腫癰閉本有虧血虧氣之分肺伏熱邪不
能生水膀胱絕其化源便秘而渴此當清肺以利
水者也熱結膀胱真陰乾涸陽無以化便秘不渴
此當清膀胱以導濕者也黃柏氣味純寒雖能下
行以除膀胱濕熱但肺金不肅則化源無滋又安
能上達於肺而得氣分俱肅乎知母味辛而苦沉
中有浮降中有升既能下佐黃柏以泄腎水復能
上行以潤心肺汪昂曰黃柏人二經血伴氣清肺
肅而濕熱得解是以昔人有云黃柏無知母猶水

母之無緼誠以見其金水間源子母一義不可或

離之義震亨曰小便不通有熱有濕有氣結於下

不燥但膀胱熱宜濕膀胱此正治如因脾熱不能

生水則清肺此隔二之治如因脾濕不運而津不

上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔三之治瀉

膀胱黃拓知母之類清肺車前茯苓之類燥脾二

類之故書皆言用此在上則能清肺止渴却頭痛

潤心肺解虛煩喘吐血衄血去痰中脘臭在中

則能退胃火平消癰在下則能利小水潤大腸去

膀胱肝腎濕熱腰脚腫痛并治癆瘵內熱陰火熱

淋崩渴等症若謂力能補陰則大謬矣補陰惟地黃為首

以謂此性最沉寒本無生氣用以清火則可用以補陰則何補之有第其陰柔巽順似乎有德猶之小人在朝國家元氣受其剝削而有陰移而莫之覺者是不可不知之真而辨之早也讀此可爲妄用知母黃柏一箴得酒浸上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

青熊濕草

青熊端入係藍靛汁沫攪澄掠出取乾而成味鹹性寒也青大瀉肝經實火及散肝經火鬱初義曰一婦也

脾腹二陰起生濕熱并而痛出黃汗一便淋用
銀鱗松脂黃丹之類塗之熱痛愈甚其婦嗜酒
食魚蝦發風之物乃用助商竟四兩研爛入青代
一兩和陰熱痛皆去仍服八正散而愈此小下焦
諸熱風熱毒氣若不出當作腸風故凡小兒風熱
內痔婦下能禁酒物果仍發痔
驚癇疳毒丹熱癰瘡蛇犬等毒金瘡血出腫痛蟲
食並天行頭痛瘟疫熱毒發斑止血咯血痢血等
症或應作丸為衣或用為末乾滲或同水調敷或
入湯同服或作餅子投治如聖餅子治咯血川青
根皆取苦寒之性以散風熱燥結之義即云功與
藍等而止血拔毒之功與治隔化蠱之力似較藍

而更勝也。和滑白鹽水。吹口疳。最妙。取麝香者。

水飛淨。石灰用鹽醃。兼有石灰。敷瘡。殺蟲。最奇。與

禹下膈。非此不除。藍葉與葉。即名大青。大渴。肝膽

實火。以祛心胃熱毒。故於時疾。陽毒。發斑。喉痺。等

症。最利。

斑山裡實去虛而得。故斑得以透肌。斑如疹。其熱重。而胃爛也。古

紫黑者。其熱重。而胃爛也。古藍子止能解毒除疳。

故於瘟疫蠱毒之症。最妙。

龍膽草 山草

龍膽草

出人肝膽兼入膀胱腎

大苦大寒。性寒。純陰。大瀉肝

膽火邪

時珍曰胆火寄在肝膽有移無補故能移

也

兼入膀胱腎經除下焦濕熱與防已功用相同

故書載治骨間寒熱驚癇熱天行瘟疫熱利瘕

黃與濕脚氣

脚氣因是傷於寒濕而成但腫而痛者為濕脚氣宜清熱利濕搜風拘攣

枯細痛而不腫者名咽喉風痺並酒炒同柴胡

乾脚氣宜養血潤燥

治赤睛弩肉

江昂曰目疾初起宜發散忌用涼藥但此苦寒至極

兆張云其等於嚴冬黯淡慘肅此草凋殘苦寒伐

標宜暫而不宜久如聖世不廢刑罰所以佐德意

之無窮苟非氣壯質熱者率爾輕投其敗也必矣

甘草水浸桑川小豆貫衆砂使惡地黃

玄參

玄參補入苦鹹微寒色黑入腎雖載能壯水以

制浮遊無根之火攻於咽喉腎脈貫肝膈入肺出

水虛則相火上炎者多有喉痺則肺咳嗽吐血等症謂其腎水受傷其陰失

守孤陽無根發為火病得此色黑性潤微寒以為

節制則陽得陰歸而咽喉不致腫痛而莫已也然

此只可暫治以熄其火非若地黃性稟純陰力能

溫腎壯水以制陽光即書有言服此玄參可以益

何行
遊之火
攻於咽

精明日消痰除嗽及治一切骨蒸傳屍發斑

有陽此止就 畏懼煩渴癰癰疔等症皆是從其

半遊火熄起見而言病無不治非真真陰虧損必

藉此以為之壯以公參其性微寒故止可 若使病非

火起則服此寒消之味不更使病轉劇乎是以書

載脾虛泄瀉服此無參為大忌耳蒸過焙用勿犯

錢器惡黃者山茱萸聚灰藜蘆

射干 毒草

射干 端人心 形如烏羽烏扇又以烏羽烏扇為名

熱火清
熱解
散熱
真

辛苦微寒。膏載瀉火解毒散血消痰然究毒之所
胎血之所聚痰之所積又皆因火結聚而成火處
為射干若能降火寒能勝熱兼因味辛上散俾火
降熱除而血與痰與毒無不因之而平矣是以喉
痺咽痛結核疳疔便毒瘰癧等症因於老血結於
心脾痰涎積於太陰厥陰者凡無不可以訓治
如金匱之治欬氣之用射干麻黃治瘰癧中煎
九川烏扇燒過千金之治喉痺川烏扇膏搗汁
治便毒之用射干同生並煎服皆取性主降功

本草綱目 卷六 海火附 四

多於上服則必瀉之意若脾胃虛寒切忌泔浸者
熟炒川

天冬

蔓草

天門冬

當人

吐苦大寒。據昔載瀉肺火及兼補腎

然究止偏苦寒安能滋腎而補水乎

的解

所云能補

水者以肺本清虛涼則氣平而不擾熱則氣行而

不生。止肺為降母。肺金失養則腎亦燥而不寧。腎

氣上攻則肺益燥而受挫。而此咳嗽吐衄痰結燥

渴肺癰肺痿等症。非不因之早呈

肺癰木於五火及胃值

清肝火以燥化濕之口

上蒸與外感風寒內傷熱而熱結而成痙則本於
 津液枯竭不能止舒於肺及風熱傷衛而後氣逆
 力疲故痙有血而無沫而便多下厥虛痙則邪傷於
 衛故痙有沫而無血而便多下厥虛痙則邪傷於
 脾作燥而渴痙則口中不燥而步武喘鳴冲悸連
 聲而痙始應痙則胸中隱隱作痛痙則胸中不痛
 而氣餒不振應則脈數而實痙則脈數而虛痙則
 宜於宜下痙則宜於宜潤治法因於內者從內而
 治因於外者從外而治因於虛者養血補氣保肺
 因於實者泄熱得此清肅之品以為化源之自則
 諸痙開提升散
 腎水必即補而補腎之基未必不於所清而先具
 也是以又云補腎但其性消利脾胃虛寒及無熱
 而泄者最忌
 苦泄熱寒賤熱者無
 熱而泄則不得用
 取肥大明亮者

良去心皮酒蒸用地黃貝母為使惡鯉魚二冬炙

膏良

丹皮 三言五

牡丹皮 傷人心 辛苦微寒能入手少陰心足少陰

腎足厥陰肝以治三經血中伏火時珍曰伏火即

陰火也陰火即相火也相火熾則血必枯必燥必

滯與火上浮而見為吐為衄 汪昂曰血屬陰本靜

上虛損與風與痰與火相搏而見五癆驚癇癰癧

癰則筋急而縮癰則筋緩而伸或伸或縮手如拽

錐謂之癰癧即俗所謂為搐無則外有所觸心包

相火 金火 木火 水火 土火

所主病則卒然昏仆身軟吐痰時發時止五勞一
日志勞二日心勞三日思勞四日憂勞五日憂勞
痰結而見瘡瘍癰毒產難並無汗骨蒸陰虛又非
邪鬱故見
無汗用此不特味辛而散血中之實熱且有涼相
骨蒸用此不特味辛而散血中之實熱且有涼相
火之神功世人專以黃柏治相火而不知丹皮之
功更勝蓋黃蘗惡寒而燥初則傷胃久則敗陽苦
燥之性徒存而補陰之功絕少丹皮赤色象離能
湯陰中之火使火退而陰生所以入足少陰而佐
滋補之用較之黃蘗不啻霄壤矣張元素曰丹皮
治無汗之骨蒸地骨皮治有汗之骨蒸神不足者

手少陰心志不足者足少陰腎氣丸用升

治神志不足也內經曰水之精為志故腎氣丸但補

性少而泄性多凡虛寒血崩經行過期不盡者為

並禁焉赤者利血白者兼補氣酒拌蒸用忌蒜胡

荃伏仙

黃蘗黃蘗

黃柏黃柏 青人同知母用於六味丸中名為

知藥八味丸又同知藥各一兩酒洗焙研入桂名

為滋腎丸時珍曰如佐黃柏滋陰降火有金水相

生之義古云黃柏知母猶水用之無

大黃
少陰
和

也。謂黃柏能制命門膀胱陰中之謂其可為真

陰此說一出而天下翕然宗之以至於今卒不可

破詎知黃柏性寒至陰味苦性寒行陰冬肅殺之

令故獨人少陰漏火入膀胱為熱好古曰黃柏

心黃柏人腎燥濕所歸各從其類也震亨曰火有

以折黃連之病可以制之相火者天火也龍雷

之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏

耳鳴消渴便閉及濕熱為病而見諸痿癰瘕本有

氣虛血虛脾虛腎虛濕熱死血之別但因熱傷血

血不養筋而致痺痺而拘濕則傷筋筋不束骨而

大黃
少陰
和

此方治諸般瘡毒

此方治諸般瘡毒

瘡名二妙散以治木水瀉利黃疸水腫長

王治夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脾虛

破出水雙睛凸出飲食不下痛甚其引名狀治通

利小便便滲洩之藥服通矣子珍之曰此乃奉養大

通營梁積熱損傷腎水致勝就久而乾枯則小便

不化火又逆上而為嘔噦惟經所謂關則不得小

便格則吐逆者遂處以北方大苦寒之劉黃柏如

月各一兩酒洗焙研入杜一錢為引為九分服二

成九少為前陰如刀刺火燒湧如瀑泉湧出床下
腫脹消散矣
疔血癰風漏下赤白為病熱與火
諸疳瘰癧蛇虫山攻之外聖治口舌生瘡用黃柏合
吐就寇氏衍義治心脾有熱舌煩生瘡用蜜炙之
柏青黛各一分為太人生能腦一煩生瘡用蜜炙之
延散用黃柏細辛等分為木搽或用黃柏乾薑等
分亦散但用亦藥不效者須察脈症或用中氣

是虛火上炎宜用參朮甘厚乾薑
附子之類或喻官桂引火歸元
珍其尺果洪大

按之有力可炒黑斷用使其濕熱順流而下陰火

因爾潛伏則陰不受煎熬而陰乃得長矣非謂其

陰虛損服此卽有滋潤之力也也發明曰非真能精

以潤之腎欲緊急食苦以堅之也也用火退而腎固

則無狂瀉之患矣按腎本屬水虛則熱心本屬火

虛則故於實熱實火則宜時珍曰東垣呼溪皆以

上古所未言也蓋氣爲陽而爲陰肝火煎焚則陰

血漸潤故陰虛火動之病須之然必少壯氣盛能

食者用而於虛熱虛火則徒有損而無益時珍曰

之用宜而於虛熱虛火則徒有損而無益時珍曰

不足而邪火熾盛者久服則有寒中之變逆時宜

損及縱慾求嗣之人用補陰藥往往以此二味爲

本草求真卷之四火黃真

君曰曰服餌降令太過脾胃受傷其陽助精氣
不暖致生他病蓋不知此苦寒而滑泄且苦味失
帶有反從火化之害故葉氏醫學統旨有四物加
知母黃柏外服傷胃不能生陰之戒汪昂曰按火
有虛火實火實火燥火燥火濕火相火傷火之異
實火宜濕燥火宜滋潤時火宜升發濕火宜補
為熱多病附腫經所謂謂腹脹大皆屬於熱諸病
附腫皆屬於火是也官利溫清熱而兼補肝相火
寄於肝腎乃能而之火非苦寒所能勝宜滋腎養
血壯水之主以制陽火又按諸病之中火症為多
有木經自病者如忿怒生肝火肝火熾盛思生心
是也有子母相壯者如心火旺肺火咳嗽久則移
之類是也有臟腑相移者如肺火移於小腸而為
於大腸而泄瀉心火煩焦久則移熱於小腸而為
淋瀝之類是也又有別經相移者有
脈經合病者當從其重者而治之
不問虛實竟有為去熱治勞之妙藥而不知陰寒

之性能損人氣滅人食。命門真元之火。一見而消。亡脾胃運行之職。一見而即喪。元氣既虛。又用苦寒。溫絕生機。莫此為甚。川產肉厚色深者良。生用降實火。蜜炙則不傷胃。炒黑能止崩帶。酒製治下。寒製治次。鹽製治下。

桑白皮

三白七
瀝水

桑白皮

瀝水

味甘性寒。善入肺中。氣分瀉火。利水

除痰。泄氣。綠氣與水與痰。止屬病標。其氣逆不利。與水飲膠結。米有不因火結而成。肺中火邪非瀉

肺氣也。火與元氣不兩立。火去則氣得安矣。久而不治則痰結便秘喘嗽胸消吐血口渴水腫臃脹靡不色色而見。桑白皮辛甘而寒。能於肺中治火。利水。俾火去而水自消。水去而火即滅。而氣因爾而治。時珍曰。桑白皮實則濁其子也。故肺中有水氣及喘火有餘者宜之。十劑云。燥可去濕。桑白皮赤小豆之屬是也。朱醫錢乙治脾氣熱盛咳嗽而後喘。兩肺身熱。兩散川桑白皮炒一兩。地骨皮一兩。西貝草炒半兩。每服一二錢。人粳米百粒。水煎食後溫服。桑白皮地骨皮皆能治火。從小便去。甘草海大兩錢。中梗米清肺而養血。此乃至書有云。能補元氣之不足。海肺諸方之準繩也。不過云其氣得自安。若以甘寒之味可以補氣則

當附林濕於何地乎。況本草十劑篇云燥可去濕。桑白皮赤小豆之屬是也。故濕則為重宜燥劑以除之。燥字從火。去重除之後。而言勿近燥熱之燥看。但此性寒而裂。其裂雖有甘味。不能以制。故古人有戒勿多用之條。及肺虛火衰水涸風寒作喘者。為切忌焉。為綠可縫金瘡。刮去皮取白。或恐瀉氣。蜜炙用。續斷桂心為使。忌鐵。桑乃其木之精。其木能開開利水。扎把燃火。則能去風除痺。故煎藥熬膏宜用。時珍曰。取其能利關節。除風寒濕痺諸痛也。世醫桑白皮。寒痺內熱。用桂酒法。以桑炭炙布巾。熨痺處。只解

用時育法以桑葉其用及坐桑灰上皆取此也又癰疽發背不起或瘰癧肉不腐潰及陰瘡癰流注腫痛頑瘕惡瘡失不愈者用桑木炙法去風寒火性暢達已潰則補接陽氣亦取桑通關成細片紫作小把燃火吹息炙患處每吹炙片時以桑肉磨動為度內桑椹甘涼色黑治能除熱服補托藥誠良方也桑椹甘涼色黑治能除熱陰止渴烏鬚黑髮百種風又惟可以汁熬燒酒之經年味桑耳散血除瘀破癥攻瘕桑葉清肺力愈佳

胃涼血燥濕去風明目聖濟每治吐血不止服桑服止後川補肝肺藥千金方治頭髮不長用桑葉麻葉煎汁水沫之七次可長數尺集簡治風眼下淚用腊月不落桑葉煎湯日日溫洗或入芒硝扶桑生除風濕烏鬚明目用黑芝蘇同桑葉等分為

九氣字曰經霜桑葉
研末米飲服止盜汗

山梔子

三音大
灌木

梔子

器入
心肺

味苦大寒輕飄象肺色赤入心醫言能

濕心肺熱邪使之屈曲下從小便而出肺清則氣

脫津液亦得山氣化而化故曰而三焦之鬱火以

能利小便究之皆濕肺心藥耳而三焦之鬱火以

解熱厥心痛以平心痛因熱治當用此但丹溪謂

大勢論耳若使痛喜手按皮痛喜飲熱湯其痛雖

外豈可以作熱治乎仍當以膜之陰陽及今所見

之兼症兼脈以分病之是寒是熱藥之宜吐衄血

溫宜涼則得之矣不可

以痛久成熱為泥吐衄血

淋血痢之病以息

梔子止治熱鬱之血耳若經寒

治實火之血。順氣爲先。氣行則血自歸經。治虛火之血。養正爲先。氣壯則自能攝血。衄瀉見今。腎土不強。寒熱虛實。但見病血。卽作。且能治心煩懊。五熱。治妄用。扼連。芩柏。殊爲可惜。且能治心煩懊。黃五淋。亡血津枯。口噤。目赤。風瘡等症。此數語。藥已道其大要矣。然更就其輕清以推。則浮而上者。其治亦上。故能治心肺之火。而凡在上而見消渴。煩煩懊。懷不眠。頭痛。目赤。腫痛等症。得此以除。氣燥。病血。仲景。梔子。豉。湯。川。梔。子。以治肺煩。川香。豉。以治腎燥。又用。梔。子。作吐藥。以散在腸之邪。卽經所謂高者因而越之是也。故。梔。子。就其味苦而湯吐虛煩。客熱。瓜蒂散吐痰食宿食。就其味苦而論則苦而下者其治亦下。故能瀉肝腎膀胱之火。

而凡在下而見淋閉便結疝黃痢氣吐衄血痢損
傷血瘀等症得此以泄易簡方治衄血不止用山
梔子燒灰吹之屢效普濟
方治小便不通用梔子仁十四箇麝香頭一個滄
鹽少許搗碎臍及黃良火即通怪症奇方治喫飯
不出用梔子仁十四個微炒去皮水煎服食療本
草治小兒驚風血用梔子仁燒灰水服一錢匙結按
此惟宜實惟其氣浮故仲景用此以吐上焦之
熱則宜耳痰滯惟其味苦能降故丹溪用此以降內鬱之邪
耳但治上宜生治下宜炒宜黑雖其上下皆入而
究則由自肺達下故能旁及而皆治者也此惟實
邪實熱則宜若使並非實熱概為通用恐不免有

入肺
火入腎
涼血
骨

損食泄瀉之虞矣生用瀉火炒黑止血蘇汁炒止

煩嘔內熱用仁表熱用皮

地骨皮

三石五
滋木

地骨皮

備入
肺腎

卽枸杞根也味甘氣寒雖與丹皮同

治骨蒸之劑但丹皮味辛能治無汗骨蒸此爲味

甘能治有汗骨蒸且丹皮原屬入血散瘀之品汗

者血也無汗而見血瘀則於辛於寒最宜若有汗

骨蒸而更用以丹皮辛散不竟使奪汗無血乎經

曰熱淫於內濕以甘寒地骨皮是也按地骨皮人

肺降火入腎涼血涼骨凡五內熱滯而見肌肉
熱二便癰閉胸脅痛是與夫於頭而見風痛不休
外感之風宜散而內生之於表而見潮熱無定是
風宜清熱除而風自熄於表而見潮熱無定是
煎蒸而達於表朱二允曰能透清透人所知也
退外感入實下知病或風寒散而表虛作潮往來
非柴葛所能治用地骨皮走表又走裡之藥用
其透之邪服之未有不愈者特表而出之
肺而見消渴咳嗽不寧上蒸火靡不用此解除令人
但知琴述以治上焦之火知琴以治下焦之火而
不知地骨皮之甘淡微寒深得補陰退熱之義矣
時珍常以青蒿佐此退熱屢有殊功李東垣曰地

為陰骨為裡皮為表服此既治內熱不生而於表

裡浮遊之邪無有不愈此為表裡上下皆治之藥

而於下為尤切焉但脾胃虛寒者禁服汪昂曰

枳子中寒者忌地骨皮振解者同煎小蘗煎汁治下疳甚妙甘草水浸用

枇杷葉

言平山果

枇杷葉肺入味苦氣平諸書皆言瀉肺治嗽綠嗽

多由胃氣不和肺氣不順以致火氣痰塞因而咳

嗽不已丹溪云氣有餘便是火火起則痰生服此

味苦而平則肺金清肅而氣不得上逆而順矣氣

順則痰火皆順

痰火同類

而逆者不逆

嘔咳者不咳渴者不渴是以昔人用此食以款冬
花紫苑杏仁桑皮木通等分大黃減半蜜九以治
肺熱火嗽身如火灸令其食後夜卧含化一九劑
未終而病即愈則知此為清肺治火止嗽之要劑
也取葉乾重三錢者為氣足拭淨毛以免射肺作
咳或薑炙或蜜炙各依方用

茶茗

三言世味

茶茗

謂人

大者為茗小者為茶茶稟天地至清之

氣得春露以培生意充足纖芥滓穢不受味甘氣
寒故能入肺清痰利水入心清熱解毒是以垢膩
能滌炙博能解凡一切食積不化屬滯頭目不清
熱痰涎不消二便不利消渴不止及一切便血吐
衄血衄血血痢火傷口疾等症服之皆能有效湯液
苦寒下行如何是清頭目家但熱服則宜冷服聚
者曰藥下降則上自清矣痰多服少神損久服瘦人精傷至於空心飲茶既真
入腎削火復於脾胃生寒陽虛服之無碍故不宜
服茶之症處甚多有以陽羨名者謂之真槿茶治

能降火以清頭目。有以臘茶名者。以其經冬過臘。
佐劉寄奴治便血最效。有以松蘿名者。是生於微
嵒於化食。有以日鑪名者。生於浙紹嵒於清火。有
以建茶名者。生於閩地。嵒於辟瘴。有以苦丁名者。
產於六合。嵒於止痢。有以普洱茶名者。生於滇南。嵒
於消食辟瘴。止痢。至於蒙山。世所罕有。且有許多
偽克其偽。莫辨然大要總屬導痰宣滯之品。茶與
同煎名蘇茶散能治赤白痢蓋茶雖一日之利暫
助陰虛助陽合用使其寒熱平調快而終身之累斯大損多益少服宜慎矣

犀角

三言

犀角

兼入胃

苦鹹大寒功入胃清熱及入心涼

血蓋胃為水穀之海無物不受口鼻為陽明之竅

凡毒邪必先由於口鼻而入以至及於陽明胃腑

時珍曰五臟六腑皆稟氣於胃風邪熱毒必先干之飲食藥物必先入胃犀角為解毒

之獸食百草之毒及衆木之棘角尖精力盡聚用

此苦寒之性使之崙入陽明以清諸熱百毒也熱

邪既去心經自明所以狂言妄語熱毒癰腫驚風

目赤吐血衄血蓄血時疫斑黃痘瘡黑陷等症無

不由於入胃入心散邪清熱涼血解毒之功也然
痘瘡心火初用不無冰伏之虞後用不無引毒入
心之患故必慎用始無碍耳至於壘毒之鄉遇有
飲食以犀筋攪之有毒則生白沫無毒則無若云
可以發表取汗則必毒熱閉表合以升發等味同
投則見魄汗淋漓若微毒單用則不及矣錫成以
熱華摸之香者真尤須烏不香者假成器多被蒸
其無力入湯剗磨汁入丸剗剗細納懷中待熱換
之立碎升麻爲使忌鹽

卷之四
論肝

羚羊角 三言

羚羊角

齒入肝兼入心脾

苦鹹大寒功肅入肝瀉火兼入

心肺二經考書所論主治多屬冗繞惟李時珍剖
晰甚明言羊火畜也而羚羊則屬木故其角入厥
陰肝經甚捷同氣相求也肝主木開竅於目其發
病也目睛障翳而羚羊角能平之肝主風在合為
筋其發病也小兒驚癇婦人子癇大人中氣搐搦
及筋脉繃急歷節掣痛而羚羊角能舒之魂者肝
之神也發病則驚駭不寧狂越僻謬寢寐卒死而

羚羊角能安之血者肝之味也發病則瘀滯下注
疝痛毒痢瘰癧癰瘕產後血氣而羚羊角能散之
相火寄於肝膽在氣爲怒病則煩懣氣逆噎塞不
通寒熱及傷寒伏熱而羚羊角能降之羚羊之性
稟而筋骨之精在角故又能辟惡而解諸毒碎佛牙
而燒烟走蛇虺也本經別錄甚著其功而近俗罕
能發揚惜哉時珍之論如此但此雖能清肝及肺
若使過用久用則更有伐生之氣耳多兩角一
角者勝

若一處有節而疎乃剉研極細或磨用
山羊角非羚羊也

海味
焚

人中白 三頁

人中白 肅入肝 即溺白堊之物故以白名味鹹氣

平能瀉肝經膀胱火邪使之盡從小便而出蓋勝

膀胱係溺白之故道用此正以其故道耳今人病

口舌諸瘡用之有效降火之驗也 張杲醫說云李

存喘息張思順用人中白散即時血止又延陵鎮

官魯紫鼻如傾白衣變紅頭空然張潤之用

人中白藥治之即止並不故可以治癆熱消渴痘

瘡倒陷牙疳口瘡等症但儘堪以滌熱清火而不

可以言補耳煨研用 利取白新

童便 三百五十五

童便 人肺肝心 係孩童津液而氣滲入膀胱而

出味鹹氣寒無毒為除癆熱骨蒸咳嗽吐血婦人

產後血衄量悶絕之聖藥褚澄遺書云降火甚速

降血甚神飲後溺百不一死非真不死甚言功力

之優也 又言人喉有痰則咳血殺人喉不停物壅

經云飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上

歸於肺通調水道下輸膀胱故人服小便入胃亦

隨脾之氣上歸於肺下通水道而人膀胱乃尋其

舊路也故能治肺病引火下行凡人精氣清者爲
氣濁者爲血濁之清者爲津液濁之濁者爲小便
與血同類也故味鹹而走血鹹寒能伏虛熱使火
不上炎血不妄溢是以能療諸血證也凡人久嗽
失音勞渴煩燥吐衄損傷皮膚皴裂人咬火燒絞
腸痧痛難產胞衣不下法當乘熱飲之薛已云予
在君庸見
覆車被傷七人仆地呻吟俱令牽此皆得無事凡
一切傷損不問壯弱及有無瘀血俱宜服此若腸
腹或作痛或發熱煩燥口渴惟服此一味勝似他
藥他藥雖效恐有瘀血反致誤人宜便不動臍腹
不傷氣血萬無一失單蓋熱則尚存真氣其行自
小參用此屢試有效

速冷則惟有鹹味寒性矣。若救陰却痰必以童便爲優。蓋取混元之氣。清純而不淆雜耳。但胃寒食少者勿忌今人類用秋石雖亦能入腎除熱。但經水澄火煉其元之氣全失。其功不及童便多矣。況多服久服則鹹能走血。令血凝氣滯爲病。矧有陽氣素虛。食少腸滑者。其可用之爲治乎。取童子十歲以下相火未動不食葷腥酸鹹者。佳。去頭尾取中間一節。清微如水者。用痰用薑汁。瘀用薑汁。冬月用湯溫之。

終